

## Lista 3 - Integração

Semestre 2018/2 - Prof. Ricardo M. S. Rosa

Entregar até o dia 9 de outubro de 2018

**1ª Questão:** Seja  $(f_n)_n$  uma sequência de funções mensuráveis não-negativas. Suponha que  $f_n$  decaia rapidamente para zero, em medida, no sentido em que

$$m(f_n > \varepsilon) \leq \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0.$$

Mostre que  $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} \{f_n > \varepsilon\}) = 0$  e que  $f_n \rightarrow 0$  quase-sempre.

**2ª Questão:** Seja  $(f_n)_n$  uma sequência de funções mensuráveis

(1) Suponha que  $f_n$  seja uma sequência de Cauchy em medida, i.e.,

$$m(\{|f_n - f_m| > \varepsilon\}) \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty.$$

Mostre que existe  $f$  mensurável tal que  $f_n \rightarrow f$  em medida.

(2) Suponha que  $f_n \rightarrow f$  em medida, i.e. para todo  $\varepsilon > 0$ ,

$$m(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Mostre que existe uma subsequência que converge pontualmente.

**3ª Questão:** Considere a função

$$F(t) = \int_0^\infty x^2 e^{-tx} dx, \quad t > 0,$$

que está bem definida tanto como integral de Lebesgue quanto como integral imprópria de Riemann. Mostre, usando o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, que  $F$  é diferenciável para todo  $t > 0$ , com

$$F'(t) = - \int_0^\infty x^3 e^{-tx} dx, \quad \forall t > 0.$$

**4ª Questão:** Seja  $(f_n)_n$  uma sequência de funções integráveis definidas em um intervalo finito  $[a, b]$ . Suponha que a sequência seja uniformemente integrável, no sentido em que

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_n \int_{|f_n| > \lambda} |f_n| d = 0,$$

e que  $f_n$  convirja quase sempre para uma função  $f$ . Mostre que  $f$  é integrável e que

$$\int f = \lim_n \int f_n.$$